

ダーマペン4 治療説明・同意書

- 1) 直径 0.26mm の極細の針 16 本が 1 秒間に 120 回上下に高速振動することで、皮膚に毎秒 1,920 個の穴を開けます。微細な穴を無数に開けることで創傷治癒効果（修復機能）を引き出し、コラーゲンやエラスチンなどの増生を促して、肌質や瘢痕を改善させていく治療です。
- 小じわやハリつや、毛穴の開大、ニキビ跡、クレーターの改善に有効です。穿刺の深さを調節すると同時に目的に合った薬剤（ハイラクティブ・レチナールアクティブ・CLR LOTION・ウーバープロ・ヴェルヴェットスキン PRX-T33 など）を組み合わせることで、皮膚の改善をさらに促します。
- 浅めの穿刺は 2~4 週に 1 回、深めの穿刺は 6~8 週に 1 回を推奨しております。（ヴェルヴェットスキンは 6~8 週に 1 回）3~5 回を 1 クールとしてお勧めしております。
- 治療効果には個人差があり、際立った改善が見られない場合もあります。
- 2) 表面麻酔をしますが、鼻下など、部位により痛みを感じやすい部分があります。
- 3) 施術後、点状出血が起りますが、数日から 1 週間ほどかけて引いていきます。
- 皮剥け・かさつきは 1 週間前後で治ります。角質が自然に脱落するまで、無理にこすらないようにしてください。赤み、ひりつきは浅めの穿刺の場合約 1~3 日、深めの穿刺の場合 3~5 日ほどで引いていきます。
- 4) 施術後 12 時間は洗顔、基礎化粧品の使用は不可となります。クリニック専売品の穿刺後の使用が認められる物のみ使用可です。ご希望の方は、SRS マスクパック（1 枚 2,000~2,200 円）をお求めいただけます。
- メイク・洗顔・シャワー・入浴は 12 時間後より可能です。その後は保湿と紫外線予防をお願いいたします。
- 赤みが出ている間は、サウナ、長時間の入浴、激しい運動、過度の飲酒などを避けてください。角質除去剤やスクラブの使用、美白化粧品（レチノール、AHA 含有）の使用は 1~2 週間控えてください。こすったり、引っ搔いたりせず、できるだけ刺激を与えないようお願いいたします。
- 5) 経過をみる目的で写真を撮影させていただきます。写真に関しては厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。

[施術・治療の副作用や併発症（免責）]

- 1) 施術・治療には副作用や併発症（ざ瘡、毛囊炎、点状出血、感染症、紅斑、水疱、瘢痕形成、色素脱失、長期の色素沈着等）が発生する可能性がございます。また、極まれですが、塗布する麻酔薬、使用する薬剤等にアレルギーを起こす場合があります。あらかじめご理解・ご同意ください。
- 2) 副作用や併発症が発生した場合には、状態の写真を撮影のうえで、当該写真のご送付とともに速やかに当院までご連絡ください。当院の指示に従い、診察が必要と判断された場合にはご来院ください。
- 3) 副作用や併発症が発生した場合の、当院における副作用や併発症に関する治療費については次のとおりです。
- 当院に過失が認められない場合：ご本人の負担
 - 当院に過失が認められる場合：当院の負担（ただし、施術日から 1 週間以内に、状態の写真のご送付及びご連絡をいただけない場合や、当院のご指示にしたがっていただけない場合には、ご本人の負担となります。）
 - 当院に故意又は重過失が認められる場合：当院の負担

以上の内容に付き、納得理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。

年 月 日

あおばクリニック ●●院

氏名