

SOFWAVE(ソフウェーブ) 治療説明書・同意書

◎ソフウェーブは超音波ビームによる熱を真皮層に加えることで、たるみやシワのある肌を少ないダウンタイムで改善していく治療です。施術直後の変化は僅かですが、1～2ヵ月後から次第にハリが出始めます。効果のピークは2～3ヵ月後です。月に1回程度、他の熱治療で効果を補完しながら、6ヵ月に1度の間隔での継続治療を推奨しております。治療効果には個人差があり、際立った改善が見られない場合もあります。

- 1) 事前の表面麻酔と冷風クーリングをしながら照射しますが、熱さやお痛みを感じる治療です。1shot 約4秒間超音波ビームが出続けます。その間“顔を動かさずに耐えられる痛み”を基準にパワーを調節いたします。その後、“連続で照射した際にも耐えられる痛み”のパワーに調節していきます。途中でもパワーを調節できますので、辛い場合はご遠慮なく施術者にお申し付けください。
- 2) 治療後は全体的に赤みが出ることがありますが、通常1～3日程度で改善します。浮腫みが出ることもあります。こちらも通常1～3日程度で改善します。ひりつきがある場合はアイスパックで冷やしてください。翌日になっても真っ赤に腫れていたり、部分的に火傷の症状が疑われるような場合はすぐにご連絡ください。
- 3) 治療後当日から、洗顔、シャワー、メイクが可能です。入浴、サウナ、運動、飲酒は翌日から可能になります。角質除去剤やスクラブの使用、美白化粧品(レチノール、AHA含有)の使用は1週間程度控えてください。治療期間中は日焼け止めと保湿剤を使用する必要があります。施術部位に赤みや腫れがある期間は、入浴、サウナ、激しい運動、過度の飲酒など体を熱する行為をお控えください。
- 4) 経過をみる目的で写真を撮影させていただきます。写真に関しては厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。

[施術・治療の副作用や併発症(免責)]

- 1) 施術・治療には副作用や併発症(熱傷、水疱形成、瘢痕形成、紅斑、浮腫、皮下出血、長期の色素沈着等)が発生する可能性があります。あらかじめご理解・ご同意ください。
- 2) 副作用や併発症が発生した場合には、状態の写真を撮影のうえで、当該写真のご送付とともに速やかに当院までご連絡ください。当院の指示に従い、診察が必要と判断された場合にはご来院ください。
- 3) 副作用や併発症が発生した場合の、当院における副作用や併発症に関する治療費については次のとおりです。
 - ・当院に過失が認められない場合:ご本人の負担
 - ・当院に過失が認められる場合:当院の負担(ただし、施術日から1週間以内に、状態の写真のご送付及びご連絡いただけない場合や、当院のご指示にしたがっていただけない場合には、ご本人の負担となります。)
 - ・当院に故意又は重過失が認められる場合:当院の負担

以上の内容につき、納得理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。